Évaluation de la biomasse mycologique sur les surfaces des réseaux aérauliques des systèmes de ventilation

Geneviève Marchand
Jacques Lavoie et Yves Cloutier
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail

Maximilien Debia
École de santé publique, Université de Montréal,
Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM)

Mise en contexte

- 80 % à 90 % du temps à l'intérieur
- 34 % pollution intérieure : origine biologique

Systeme CVCA mal entretenu

Accumulation de poussière déposée

Source de nutriments

Croissance microorganismes

Remise en suspension des poussières :

bactéries, moisissures, virus, mites
de poussières ou sous-produit

Effets à la santé

Syndrome des édifices hermétiques

rhinite

fièvre des humidificateurs

asthme

pneumonie d'hypersensibilité

Mise en contexte

Nettoyage des conduits de ventilation

Essentiellement

✓ Inspection visuelle du dépôt de poussières

Occasionnellement

✓ Méthode gravimétrique (poussières déposées)

		Critère	
		Déclenchement (mg/100cm ²)	Post nettoyage (mg/100cm ²)
NADCA (2006)	(post-nettoyage)		0,75
Rask 2002 (NADCA ACR 2002)		20	
Nordic ventilation group (1993)	Risk factor (dust)	2 à 5	
Italie, Angleterre, Suède, Japon		10	
ASPEC (2012)	FiSIAQ (Finlande 2008)	20 à 50	5 (2001)
	COSTIC (France 2009)	4	1

Mise en contexte

Nettoyage des conduits de ventilation

	Critère (UFC/g)
NADCA 92-01 et Liguria Italie 2002	15 000
Rask <i>et al.</i> 2002 (NADCA ACR 2002)	10^5 - 10^6
Nordic ventilation group 1993	3 000

Rarement

✓ Charge mycologique dans les poussières (biomasse mycologique)

Objectifs

- Rendre disponible une **méthode de prélèvement** des poussières déposées **adaptée** à l'évaluation de la biomasse mycologique
- Mettre au point, valider et comparer une ou des méthodes analytiques **d'évaluation de la biomasse** mycologique

Méthodologie

PREMIÈRE PARTIE

- **Échantillonnage** des poussières sur surface
 - Enceinte d'exposition

Masse de poussière déposée **CONNUE**

Dépôts de poussière contrôlés et uniformes

Méthodologie

PREMIÈRE PARTIE

- **Échantillonnage** des poussières sur surface
 - Enceinte d'exposition

DEUXIÈME PARTIE

- Méthodes **analytiques** (biomasse mycologique)
 - Mise au point (4 méthodes)
 - Enceinte d'exposition

Méthodologie

PREMIÈRE PARTIE

- **Échantillonnage** des poussières sur surface
 - Enceinte d'exposition

DEUXIÈME PARTIE

- Méthodes **analytiques** (biomasse mycologique)
 - Mise au point (4 méthodes)
 - Enceinte d'exposition

TROISIÈME PARTIE

- En **situations réelles**
 - 300 échantillons

Usines, hôpitaux, CLSC et centres d'hébergement,
établissements scolaires, tours à bureaux

Résultats

PREMIÈRE PARTIE

- **Échantillonnage** des poussières sur surface

Méthode par essuyage

Saturation rapide

Élimination du projet

Résultats

PREMIÈRE PARTIE

➤ Échantillonnage des poussières sur surface

Méthode	Effectif	Moyenne (Écart-type)
		mg
ASPEC	12	0,42 (0,27)
EMS	12	1,07 (0,22)

X 2,5

Embout rigide incorporé
vs
Tygon® flexible coupé
pour chaque utilisation

Résultats

PREMIÈRE PARTIE

- **Échantillonnage** des poussières sur surface

Résultats

DEUXIÈME PARTIE

- Méthodes **analytiques** (biomasse mycologique)
 - Mise au point (4 méthodes)
 - Enceinte d'exposition

Résultats

DEUXIÈME PARTIE

Méthode	LD	Réplicabilité (%)	Répétabilité (%)
Culture (UFC/100 cm ²)	120	12	11
Filtre (spores/100 cm ²)	1 980	4,7	9,6
Mycomètre (spores/100 cm ²)	218 000	5,6	15,4
PCR (spores/100 cm ²)	132	1,3	1,4

Meilleures performances = PCR

Résultats

DEUXIÈME PARTIE

Culture $\approx$ Filtre < PCR < Mycometer

Résultats

DEUXIÈME PARTIE

Meilleure corrélation
Culture et q-PCR
 $r=0,83$

Résultats

TROISIÈME PARTIE

- En **situations réelles**
 - 300 échantillons

Résultats

TROISIÈME PARTIE

Culture < PCR < Filtre < Mycometer

Résultats

TROISIÈME PARTIE

Meilleure corrélation
Culture et q-PCR
 $r=0,65$

Résultats

TROISIÈME PARTIE

Discussion

Méthode de prélèvement

Méthodologie enceinte et plaques de cuivre

✓ **Quantifier les pertes de façon absolue**

Filtre seulement : 13,6 %

Cassette intégrale : 1,4 %

Pertes sur parois
rapportées : 13 à 45 %

Discussion

Méthode d'analyse

Méthode	Culture	Microscopie	NAHA	qPCR
Flore	cultivable	totale	totale	totale
Analyste	qualifié	hautement qualifié	tout le monde	qualifié
Temps technique	moyen	moyen	faible	élevé
Répétabilité %	11	9,6	16,4	1
LD (spores/100 cm ²)	120	1980	218 000	130
Délais résultats	élevé	moyen	faible	faible
Coût \$	10	2	25	15
Autres		3 % de l'échantillon	appareil	appareil

Discussion

Évaluation sur le terrain

La charge mycologique
DOIT être considérée

Discussion

Évaluation sur le terrain

	Critère (UFC/g)
NADCA 92-01 et Liguria Italie 2002	15 000
Rask <i>et al.</i> 2002 (NADCA ACR 2002)	$10^5 - 10^6$
Nordic ventilation group 1993	3 000

En considérant la proposition intermédiaire (15 000 UFC/g)

$$15\ 000 * 5/100 = 300\ 000 \text{ spores/g}$$

Discussion

Évaluation sur le terrain **PROPOSITION CRITÈRE-BIOMASSE**

	Critère (UFC/g)	% de système nécessitant un nettoyage
NADCA 92-01 et Liguria Italie 2002	15 000	20
Rask <i>et al.</i> 2002 (NADCA ACR 2002)	$10^5 - 10^6$	2
Nordic ventilation group 1993	3 000	70
IRSST-BIOMASSE	300 000 spores/g	46

Discussion

Évaluation sur le terrain **PROPOSITION CRITÈRE-POUSSIÈRE**

	Critère de déclenchement
ASPEC/IRSST (Lavoie 2007-2010)	23 mg / 100 cm ²
IRSST/EMS	58 mg/100 cm²

Basée sur la comparaison **ASPEC/IRSST** et **EMS/IRSST**

Et le facteur de **2,5**

$$23 * 2,5 = 58 \text{ mg/100 cm}^2$$

Discussion

Évaluation sur le terrain **PROPOSITION CRITÈRE-POUSSIÈRE**

	Critère de déclenchement	% nettoyage selon ce projet
ASPEC/IRSST (Lavoie 2007-2010)	23 mg / 100 cm ²	85
IRSST/EMS	58 mg/100 cm²	37

Discussion

Évaluation sur le terrain **PROPOSITION CRITÈRE-POUSSIÈRE**

	Critère de déclenchement	% nettoyage selon ce projet
ASPEC/IRSST (Lavoie 2007-2010)	23 mg / 100 cm ²	85
IRSST/EMS	58 mg /100 cm²	37
Inspection visuelle	moyen et élevé	30

Discussion

Évaluation sur le terrain **PROPOSITION CRITÈRE-POUSSIÈRE**

	Critère de déclenchement	% nettoyage selon ce projet
IRSST-BIOMASSE	300 000 spores/g	46
IRSST/EMS-POUSSIÈRE	58 mg/100 cm ²	37
IRSST COMBINÉS	Poussière et biomasse	50 %

Plusieurs prélèvements dans les retours d'air

Limites

Pas conçu à l'origine pour proposer des critères

- ❖ **Des suggestions**

Pas de stratégie d'intervention

- ❖ **Nombre minimal de prélèvements**

- ❖ **Choix des sites de prélèvement**

Conclusion

Dans une approche préventive

**Charge mycologique et
Masse de poussière**

**Les critères doivent être validés et
une stratégie d'intervention
développée**

Remerciements

- ▶ **Techniciennes de laboratoire**

- Carole Pépin
- Nancy Lacombe

- ▶ **Agentes de recherche**

- Marie Gardette
- Eve Neesham-Grenon

- ▶ **Étudiantes**

- Marie-Jeanne Biyeyeme, maîtrise de recherche
- Carol-Anne Villeneuve, stagiaire

Comparison of methods to evaluate the fungal biomass in heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) dust

Marie-Jeanne Biyeyeme Bi Mve · Yves Cloutier ·
Nancy Lacombe · Jacques Lavoie · Maximilien Debia ·
Geneviève Marchand

Received: 9 February 2016 / Accepted: 7 November 2016
© Springer International Publishing Switzerland 2016

Abstract Heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) systems contain dust that can be contaminated with fungal spores (molds), which may have harmful effects on the respiratory health of the occupants of a building. HVAC cleaning is often based on visual inspection of the quantity of dust, without taking the mold content into account. The purpose of this study is to propose a method to estimate fungal contamination of dust in HVAC systems. Comparisons of different analytical methods were carried out on dust deposited in a controlled-atmosphere exposure chamber. Sixty samples were analyzed using four methods: culture, direct microscopic spore count (DMSC), β -N-acetylhexosaminidase (NAHA) dosing and qPCR. For each method, the limit of detection, replicability, and repeatability were assessed. The Pearson correlation coefficients between the methods were also evaluated. Depending on the analytical method, mean spore concentrations per 100 cm² of dust ranged from 10,000 to 682,000. Limits of detection varied from 120 to 217,000 spores/100 cm². Replicability and repeatability were between 1 and 15%. Pearson correlation

coefficients varied from -0.217 to 0.83. The 18S qPCR showed the best sensitivity and precision, as well as the best correlation with the culture method. PCR targets only molds, and a total count of fungal DNA is obtained. Among the methods, mold DNA amplification by qPCR is the method suggested for estimating the fungal content found in dust of HVAC systems.

Keywords Indoor air quality · HVAC systems · Sampling methods · Dust · Fungal biomass

Introduction

In North America, the decision to have a ventilation duct system cleaned is based on a visual assessment of the amount of dust accumulated on the inner duct surfaces (Lavoie et al. 2010, 2011; NADCA 2006). To address the subjective nature of this method of assessment, various organizations have proposed quantitative criteria for evaluating HVAC cleanliness (Lavoie et al. 2010, 2011; NADCA 2006). However, none of these criteria takes into account the mycological content of the deposited dust. A number of authors have shown that poorly maintained HVAC systems can be contaminated by fungal particles (Burge et al. 1985; Krause and Hammad 2002; Mendell et al. 2003). The dust deposited in HVAC systems is a source of nutrients that in the right conditions can support the growth of mold (Foard et al. 1996; Mensah-Antipoo et al. 2015). Xerophilic molds can grow easily in low water environments such as HVAC dust. Krause and Hammad (2002) have shown

M.-J. Biyeyeme Bi Mve · Y. Cloutier · N. Lacombe ·
J. Lavoie · G. Marchand
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail,
505 Boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal H3A3C2, Canada

M.-J. Biyeyeme Bi Mve · J. Lavoie · M. Debia ·
G. Marchand (✉)
Département de santé environnementale et santé au travail, École
de santé publique, Université de Montréal, Pavillon Marguerite
d'Youville, 2375 Chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal H3T
1A8, Canada
e-mail: marchand.genevieve@irstet.qc.ca

Évaluation de la biomasse mycologique sur les surfaces des réseaux aérauliques des systèmes de ventilation

Geneviève Marchand
Nancy Lacombe
Carole Pépin
Marie-Jeanne Biyeyeme Bi Mve
Carol-Anne Villeneuve
Marie Gardette
Jacques Lavoie
Maximilien Debia
Yves Cloutier

RAPPORTS
SCIENTIFIQUES

R-965